

QUOI FAIRE SI VOUS AVEZ DES SYMPTÔMES DE LA COVID-19



Fièvre



Toux ou mal de gorge



Perte du goût ou de l'odorat



ISOLEZ-VOUS ET FAITES UN TEST RAPIDE À LA MAISON

Quoi faire selon le résultat obtenu ?



Les personnes qui vivent sous le même toit doivent aussi s'isoler.

1^{er} test

Positif

ISOLEZ-VOUS



Négatif

ISOLEZ-VOUS et faites un 2^e test 24 h plus tard



+



2^e test

Positif

ISOLEZ-VOUS



Négatif

Reprenez vos activités en respectant les consignes sanitaires

DURÉE DE L'ISOLEMENT

Si vous n'avez pas de tests rapides :

isolez-vous



L'isolement commence à partir de la date de début des symptômes ou du prélèvement si aucun symptôme.

12 ans et plus		Moins de 12 ans	Personnes immunosupprimées
Adéquatement vacciné	5 JOURS* (les 5 jours suivants avec le port du masque)	5 JOURS et refaire un test rapide après le 5 ^e jour.	21 JOURS
Non adéquatement vacciné	10 JOURS	<ul style="list-style-type: none"> • Si le test est positif, poursuivre l'isolement durant 5 jours supplémentaires. • Si le test est négatif, l'enfant peut reprendre ses activités.* 	

* Si les symptômes s'améliorent et après au moins 24 heures sans fièvre.

[Québec.ca/testCOVID-19](https://quebec.ca/testCOVID-19)

Des particularités peuvent s'appliquer, consultez [Québec.ca/isolement](https://quebec.ca/isolement).